

QUELLE PRISE EN CHARGE ?

En agissant tôt, ces difficultés d'apprentissage peuvent être atténuées, et le handicap diminué. Plus la prise en charge est précoce, plus l'enfant peut progresser et son entourage s'adapter en comprenant ses difficultés.

Il n'est jamais trop tard pour agir !

1. Diagnostic pluridisciplinaire

posé par des spécialistes des TND dans les structures dédiées grâce à des outils d'évaluation et des questionnaires spécifiques, avec des pédiatres et neuropédiatres, généticiens, neuropsychologues, pédopsychiatres etc.

2. Suivi et accompagnement régulier

Equipe composée d'orthophonistes, psychomotriciens, orthoptistes, kinésithérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, pédopsychiatres, puéricultrices, pédiatres

Afin d'éviter plus tard :

- Difficulté d'apprentissage, isolement, épuisement parental
- Perte de l'estime de soi
- Troubles de l'humeur
- Répercussions intra familiales: violences, récurrences de TSAF dans la fratrie
- Enjeu économique, précarité

A QUI S'ADRESSER?

Sans culpabiliser la famille et même dans l'incertitude ...

POUR ORIENTER L'ENFANT

Médecin généraliste ou pédiatre

qui pourra adresser aux spécialistes: neuropédiatre, ORL, ophtalmologiste

Plateforme de Coordination et d'Orientation

PCO des Ardennes

12 Cours Aristide Briand, 08000 Charleville-Mézières

PCO de la Marne

5bis Allée des Landais, 51100 Reims

PCO de l'Aube

77 Rue de Preize, 10000 Troyes

PCO de la Haute Marne

rue Albert Schweitzer, 52100 Saint Dizier

Centre Médico-Psychologique (CMP)

Centre Médico Psycho-Pédagogique (CMPP)

Centre Action Médico Sociale Précoce (CAMSP)

POUR AIDER LA FAMILLE

Vivre avec le SAF :

www.vivreaveclesaf.fr

06 34 12 12 87

POUR PARLER DE L'ALCOOL ET DES AUTRES SUBSTANCES

Des structures et des professionnels de l'addictologie peuvent accueillir des femmes consommatrices d'alcool ou d'autres substances sur votre territoire

Pour trouver un professionnel près de vous,

consultez l'Annuaire en ligne:

www.grandestaddictions.org/annuaire

TROUBLES DU SPECTRE DE L'ALCOOLISATION FOETALE (TSAF)

REPÉRER, ORIENTER ET ACCOMPAGNER PRÉCOCEMENT LES ENFANTS

MOINS
3 ANS



Y PENSER TÔT POUR AGIR TÔT

A destination des professionnels de santé de la petite enfance

TSAF : QU'EST CE QUE C'EST ?

La consommation d'alcool pendant la grossesse est toxique pour le développement du futur bébé, en particulier son cerveau.

Les conséquences sont des troubles neurodéveloppementaux : les Troubles du Spectre de l'Alcoolisation Fœtale (TSAF)

Incidence : 1 enfant sur 100

La forme la plus complète des TSAF est le Syndrome d'Alcoolisation Fœtale (SAF) associant:


- Petit périmètre crânien
- Traits faciaux caractéristiques
- Petit poids, petite taille

Des malformations peuvent être associées: cérébrales, cardiaques, ORL, squelettiques etc.

Incidence: 1 enfant sur 1000

Traits faciaux distinctifs

Traits associés



Vivre avec le SAF ©

QUAND Y PENSER ?

Pour aller plus loin dans le dépistage du SAF et du TSAF

Algorithme diagnostic, signes cliniques de 0 à 6 ans ...



Signes cliniques évocateurs: **Nourrisson :**

Petite tête: Périmètre crânien inférieur à la normale, voire microcéphalie

Retard de croissance: Retard staturo-pondéral

Troubles du tonus: Enfant hypertonique, retard à l'acquisition de la position assise puis debout

Difficultés d'apaisement et

d'autorégulation: Pleurs fréquents, et difficulté de maintenir l'enfant dans les bras

Difficultés d'alimentation: Troubles de la succion et de la déglutition, réflexes nauséeux fréquents

Troubles du sommeil: Difficulté d'endormissement et réveils fréquents

Troubles sensoriels: Réactions parfois diminuées ou excessives au bruit, à la lumière, au toucher

Signes cliniques évocateurs: et jusqu'à 3 ans :

Troubles de la motricité fine: Difficulté dans les jeux de coordination, d'équilibre et de ballon

Troubles du comportement: Colères intenses et intolérance à la frustration, agressivité

Troubles de l'alimentation: Sélectivité des repas, parfois refus des nouvelles textures, agité pendant les repas, mange peu à la fois

Difficultés de communication: Ne montre pas du doigt, retard à l'apprentissage du langage, facilement distrait

Troubles de la socialisation et de

l'autonomisation: Ne comprend pas les émotions des autres, difficulté à jouer avec les autres, difficulté à s'habiller seul

TOUT TROUBLE DU DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR OU DU LANGAGE DOIT ALERTER

